

	хирургический	медикаментозный	вакуум-аспирация
Срок	До 12 недель по аменорее	До 7 недель по аменорее	До 5 недель по аменорее
Как делается	С применением общей анестезии. Применяются расширители цервикального канала и кюретки для удаления плодного яйца.	С применением медикаментов: мифепристона и простагландинов.	С помощью мануального вакуум-асpirатора под местной анестезией. В полость матки вводится атравматичная силиконовая насадка, и с помощью вакуум-асpirатора создается отрицательное давление, происходит полная эвакуация содержимого матки.
Сколько времени занимает процедура	В зависимости от срока беременности и опыта врача. Чем больше срок, тем дольше длится процедура, так как это технически сложнее. В среднем 15-20 минут.	Первая таблетка – в день обращения, вторая – через 1 день.	15-20 минут
Надо ли наблюдаться после аборта?	Необходим осмотр после очередной менструации.	УЗИ после произошедшего выкидыша и осмотр после очередной менструации, остальное – по усмотрению врача.	УЗИ после манипуляции, осмотр после очередной менструации
Какие анализы надо сдавать перед абортом?	Мазок на флору и скрытые инфекции, общий анализ крови, общий анализ мочи, кровь на гепатит С и В, МРС, гемостазиограмма, УЗИ	Мазок на флору и скрытые инфекции, общий анализ крови, общий анализ мочи, кровь на гепатит С и В, МРС, гемостазиограмма, УЗИ	Мазок на флору и скрытые инфекции, общий анализ крови, общий анализ мочи, кровь на гепатит С и В, МРС, гемостазиограмма, УЗИ
Дополнительно	С хирургическим абортом может быть связано ряд серьезных осложнений: Осложнения, связанные с анестезией (в/в наркозом), перфорация матки во время аборта расширителем цервикального канала, маточным зондом или кюреткой, постабортный синдром (психологическая проблема), воспалительные процессы половых органов, бесплодие, истмико-цервикальная недостаточность, невынашивание беременности, рубцовая деформация шейки матки, «эрозия» шейки матки нарушение гормонального фона, отдаленные последствия: синдром Ашермана, миома матки, эндометриоз, мастопатия	Не рекомендуется женщинам с нарушением гемостаза, с бронхиальной астмой, миомой матки размерами более 6 недель. Этот вид аборта можно проводить амбулаторно, но обязательно под наблюдением врача. Осложнения медикаментозного аборта: кровотечение, пролонгирование беременности, воспалительные процессы органов малого таза, неполный выкидыш, постабортный синдром (психологическая проблема), отдаленные последствия (реже, чем при хирургическом аборте): мастопатия, нарушения менструального цикла, миома матки	Во время проведения вакуумного аборта не используются расширители цервикального канала, острые кюретки и общий наркоз.